

## Gender dan risiko terkendalnya gejala putus opiat pada pasien ketergantungan opiat

Yuniar Sukmawati, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=71948&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

**LATAR BELAKANG:** Di Indonesia faktor yang mempengaruhi terkendalnya gejala putus opiat belum diketahui. Dengan mengetahui faktor-faktor tersebut dapat dipakai untuk prognostik terkendalnya gejala putus opiat, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian hal tersebut.

**METODE:** Penelitian kohor historikal pasien ketergantungan opiat yang dirawat inap di RS Ketergantungan Obat 1 Januari 2000-31 Desember 2001. Semua pasien wanita (60 orang) yang memenuhi kriteria inklusi diambil, dan pasien laki-laki diambil 130 secara sistematis dari 914 pasien laki-laki yang masuk kriteria inklusi. Analisis data dengan survival analysis menggunakan cox proportional hazard untuk mencari perhitungan pengendalian gejala putus opiat.

**HASIL:** Waktu yang diperlukan untuk terkendalnya gejala putus opiat antara 3 - 16 hari dengan rata-rata 9 hari. Umur terbanyak 21-30 tahun dengan rata-rata 23 tahun. Umur termuda pertama kali menyalahgunakan opiat adalah 12 tahun, lama penyalahgunaan antara 6 bulan sampai 15 tahun, cara pakai sebagian besar (88,4%) menggunakan jarum suntik. Kebanyakan adalah pengangguran (54,2%). Faktor pemberian terapi tidak bermakna secara statistik dalam pengendalian gejala putus opiat. Gender laki-laki lebih mudah terkendali 1,71 kali dibanding gender perempuan (CI 95% 1,17; 2,49; p 0,006).

**KESIMPULAN:** Perempuan lebih susah dikendalikan gejala putus opiatnya, oleh karena itu memerlukan perhatian lebih banyak dibandingkan gender laki-laki.

*Gender and Risk That Can Handle Opiate Withdrawal Syndrome for Opiate*

**DependencyBACKGROUND:** Factors can influence opiate withdrawal syndrome in Indonesia there is no detail data. With the most important factor, could be better to manage them especially when they are being hospitalized.

**METHODS:** Cohort historical study about opiate dependence patients who are being hospitalized in Drug Dependence Hospital Jakarta from January 1st 2000 to December 31st 2001. All the women include in criteria as a sample (60 patients), and 130 male patients as a sample with systematic sampling from 914 patients can include in criteria. Data analysis with the survival analysis, using cox proportional hazard to find number of controlled opiate withdrawal syndrome.

**RESULTS:** The opiate withdrawal syndrome can be controlled in 3 - 16 days and 9 days in average. The range of age is 21 to 30 years old and 23 years old in average. The youngest age using opiate is 12 years old. The length of abuse is between 6 month to 15 years, using needle is 88,4 %, mostly is jobless (54,2%). Treatment factor is not significant statistically. Men is easier to control, it's about 1,71 times than women

(CI 95 % 1,71;2,49, p = 0,006)

CONCLUSIONS: Women need more attention to get at the best results opiate withdrawal syndrome.</i>