

# Faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku ibu dalam pemberian cairan rehidrasi oral di rumah pada balita diare yang berobat ke puskesmas se kota Banjarmasin tahun 2001

Rita Kirana, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=93530&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

Salah satu penyebab tingginya angka kematian Balita di Indonesia adalah diakibatkan penyakit diare. Angka diare yang didapat dari Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT, 1995) bila diproyeksikan pada semua golongan umur adalah 54/100.000 penduduk dan pada Balita terjadi kematian 55.000 (2,51/1000 Balita). Propinsi Kalimantan Selatan merupakan daerah endemis diare. Berdasarkan Profil Kesehatan Kalimantan Selatan tahun 1995, telah terjadi tiga kali kejadian luar biasa (KLB) pada dua kabupaten yang mencakup 5 kecamatan dan 8 desa Di kota Banjarmasin sebagai ibukota Propinsi Kalimantan Selatan, menurut klasifikasi rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit, diare menduduki urutan pertama dan menduduki urutan ke dua di Puskesmas. Dari data Profil Dinas Kesehatan kota Banjarmasin tahun 2000, salah satu upaya penanggulangan diare adalah dengan pemberian cairan rehidrasi oral (oralit) kemasan (92,69%) kepada penderita diare. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang berhubungan dengan perilaku ibu dalam pemberian cairan rehidrasi oral di rumah pada Balita diare yang berobat ke Puskesmas se kota Banjarmasin tahun 2001. Rancangan penelitian ini adalah Cross Sectional. Populasi adalah ibu-ibu yang mempunyai balita diare dan berobat ke Puskesmas se kota Banjarmasin, sedangkan sampel adalah ibu-ibu yang mempunyai balita diare yang berobat ke Puskesmas se kota Banjarmasin pada bulan Maret tahun 2001 (Quora Sampling). Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dan wawancara langsung. Data kemudian diolah secara statistik dengan teknik analisis Chi Square dan Multiple Regression Logistic. Dari hasil analisis bivariat diketahui ada empat variabel yang mempunyai hubungan bermakna terhadap perilaku ibu dalam pemberian cairan rehidrasi oral di rumah pada Balita diare, yaitu variabel pendidikan, variabel penghasilan, variabel sikap, dan variabel ketersediaan cairan rehidrasi oral. Sedangkan variabel umur subyektif dan variabel rasa diketahui tidak ada hubungan yang bermakna dengan perilaku ibu dalam pemberian cairan rehidrasi oral di rumah pada Balita diare. Dari model Regression Logistic diketahui ternyata variabel yang paling berhubungan dengan perilaku ibu dalam pemberian cairan rehidrasi oral di rumah pada balita diare adalah variabel sikap yang dinyatakan dengan nilai Odds Ratio terbesar yaitu 8,508 (95% CI = 1,0/-1-9 - 68,981). Yang berarti ibu yang bersikap positif kemungkinan memberikan cairan rehidrasi oral pada balitanya yang diare sebesar 8,508 kali lebih besar dibandingkan ibu yang bersikap negatif terhadap pemberian CRO pada balita diare. Sebagai saran untuk tindak lanjut, maka upaya yang sebaiknya dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin adalah perlunya peningkatan dan pengembangan Program Pemberantasan Penyakit Menular Diare sehubungan dengan didapatkannya informasi dari penelitian ini tentang rendahnya pemberian cairan rehidrasi oral di rumah oleh ibu kepada balita diare. Bagi Puskesmas se kota Banjarmasin, disarankan agar lebih meningkatkan dan mengembangkan materi penyuluhan tentang diare dan cairan rehidrasi oral. Disarankan juga perlunya penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku ibu dalam pemberian cairan rehidrasi oral di rumah pada Balita diare, dengan melihat variabel-variabel lainnya, seperti, suku, tingkat pendidikan suami, status pekerjaan dan lain-lain.

<hr><i>One of the causes of Child Mortality Rate in Indonesia is diarrhea. According to household health survey ( SKRT, 1995) the incidence of diarrhea all age groups is 54/100.000 and among child under five years old is 55.000 deaths (2.5/1000). South Kalimantan is endemic area of diarrhea. Based on health profile of south Kalimantan 1995, there were three times diarrhea epidemic incidence. In two regencies which covered 5 sub districts and 5 villages. While in Banjarmasin as capital of South Kalimantan, according to classification of medical treatment in hospital placed at first rank and second in public health center. From health office profile of Banjarmasin city 2000, one of effort to cope with diarrhea is provide oral rehydration fluid (92,69%) to patients. Objective of this research is to find out factors that related to mother's behavior In The Use oral rehydration fluid at home to children under five years old with diarrhea who has taken medical care to public health centers in Banjarmasin city year 2001. This research use Cross Sectional Design. Population and sample are mothers which their children under five years old get diarrhea and take medical care to public health centers in Banjarmasin city, where as sample are mothers who brought their children under five years old get diarrhea and take medical care to public health centers in Banjarmasin city in March 2001 (Quota Sampling). Data collecting use questioner and interview. Data processed statistically and analyzed with Chi Square and Multiple Regression Logistic techniques. Bivariate analysis, should four variables were proved to be significant by correlated with mother's behavior in the use oral rehydration fluid to children under five year old at home. They are education variable, knowledge variable, attitude variable and availability variable. While subjective nomi variable and taste variable found have no significant correlation with mother's behavior In The Use oral rehydratori fluid at home. From regression logistic model found the most significant variable related to mother behavior In The Use oral rehydration fluid at home is attitude variable with Odds ratio 8,508 ( 95% CI = 1,049 - 68,9811 From result of interaction test not found any significant correlation between variable. Based on result of this research health office of Banjarmasin should improve and develop of transmitted disease program for diarrhea because lack of mother's which giving their child with diarrhea with oral rehydration Fluid at home. For every public health centers in Banjarmasin, should improve and develop education matters about diarrhea and oral rehydration fluid. Other suggestion is conduct the other research with more variable, such as ethnic, husband education.</i>